



PLAN ZAŠTITE BRESKVE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Mirovanje vegetacije	Kovrdžavost lista, šupljikavost lista, prezimljujuće forme, štetnih insekata	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG + Ovitex	0,3 % 0,4 % 2 %
Na početku bubrenja pupoljaka	Kovrdžavost lista	Fitociram 75 S	0,3%
Zelena tačka	Kovrdžavost lista	Fitociram 75 S	0,3 %
Roze pupoljak	Kovrdžavost lista, pepelnica, tripsi	Kanton 700 WG Token 100 EC ili Topas Futocid EC	0,1 % 0,05 % 0,05 %
Cvetanje	Monilija	Calcio 75 WG	200 g/ha
Precvetavanje	Monilija, pepelnica šupljikavost lista tripsi, biljne vaši	Prunus 450 SC Prevent 80 WP Monofos 20 SP Futocis	0,05 - 0,1 % 0,25 % 0,04 % 0,05 %
Formirani plodovi	Monilija, pepelnica šupljikavost lista breskvin smotavac, biljne vaši	Tebusha 25 EW Primus 80 WG Optimist 80 WG Skener 25 WG +Nexiram 10 EC	0,075 % 2,5 kg/ha 0,02 % + 0,1 %
Nakon proređivanja	Monilija, pepelnica, šupljikavost lista breskvin smotavac	Tebusha 25 EW Kanton 700 WG Ditox 40 EC	0,075 % 0,075 % 0,1 %
15 dana pred berbu	Bolesti ploda Štetni insekti	Markiz WG Futocid EC	0,75 kg/ha + 0,03%
Poslednji tretman pred berbu	Trulež ploda, breskvin smotavac, biljne vaši	Enygma 62,5 WG Futocis 2.5 EC	0,08% 0,03%
Posle berbe	Grinje	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,1%
	Žilogriz	Glowis CS	2 l/ha (inkorporacija u zoni reda)
Jesenji plavi tretman	Kovrdžavost lista, šupljikavost lista	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,3% 0,4%



PLAN ZAŠTITE BRESKVE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Posle berbe	Grinje Žilogriz	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC Glowis CS	0,1% 2 l/ha (inkorporacija u zoni reda)
Jesenji plavi tretman	Kovrdžavost lista, šupljikavost lista	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,3% 0,4%

Futocis® 2.5 EC

И Н С Е К Т И Ц И Д



Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu.

Suzbijanje korova:

Dessicash SL 3-4l/ha kada su korovi 15-20cm visine (uskoliski i širokoliski) – Zasadi mlađi od 4 godine.

Rugby 15-SL 5l/ha – Zasadi stariji od 1 godine.

Quick EC ili Lector Super 2l/ha (uskoliski korovi).

SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU!

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!