



PLAN ZAŠTITE PŠENICE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Količina primene
Tokom bokorenja do drugog kolenca	Širokolisni korovi	herbicide na bazi a.m. 2-4 D	15 g/ha
Od prvog kolenceta, do lista zastavičara	Pepelnica, rđa, bolesti lista i stabala	Tebusha 25 EW	0,5 - 1 l/ha
	Biljne vaši, žitna pijavica	Futocis 2,5 EC ili Futocid EC	0,3 l/ha 0,1 l/ha
	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi	Messi 60 WG*	10 g/ha
Od lista zastavičara do početka cvetanja	Fuzarioza klasa, pepelnica, rđa, siva pegavost lista i stabla	Comrade	1 l/ha
Suzbijanje korova nakon žetve	jednogodišnji i višegodišnji korovi	Bingo ili Nasa SL	3-10 l/ha

* radi proširenja delovanja na Gallium aparine dodati herbicide na bazi a.m. fluroksipir-meptil

MESSI® 60 WG

Х Е Р Б И Ц И Д

NOVO!



Selektivni, translokacioni herbicide namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta u usevu pšenice.