

PLAN ZAŠTITE SOJE

Razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine/ korova	Naziv preparata	Kolicina primene
Posle setve, a pre nicanja useva	jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi	Oktagon 960 EC + Buzzin 70 WG	1,2 l/ha 0,4 kg/ha
		Boston 480 SL + Imazar 40 + Tiffany 75 WG	2 l/ha 1 - 1,2 l/ha 8 g/ha
Posle nicanja useva i korova, a kada je soja u fazi od 1-3 trodijelne	Jednogodišnji i višegodišnji širokolisni i uskolisni korovi	Boston 480 SL + Sojal 75 WG + Tiffany 75 WG + Cyrasil	2 l/ha 80 - 100 g/ha 8 g/ha 0,1 l/ha
		Boston 480 SL + Komersant 4-E + Tiffany 75 WG + Cyrasil	2 l/ha 0,3 - 0,5 l/ha 8 g/ha 0,1 l/ha
Nakon formiranja prve trodijelne pa do cvetanja, a kada su uskolisni korovi 3-5 listova	Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi	Quick 5% EC ili Lector Super	1 - 2 l/ha 1 - 2 l/ha
Tokom vegetacije	Fitofagne grinje	Romectin 18 EC ili Bektin 18 EC ili Ortus 5 SC	0,75 l/ha 0,75 l/ha 0,4 l/ha
Dve nedelje pre žetve	Desikacija	Dessicash 20% SL ili Didikvat	2,5-3,5 l/ha 3,5-4,5 l/ha