



PLAN ZAŠTITE KRUŠKE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Kretanje vegetacije	Kruškina buva	Ovitex + Notikor 200 EC	3 % 0,05 %
Bubrenje pupoljaka	Čađava pegavost i krastavost plodova, bakteriozna plamenjača	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,3 % 0,4 %
Mišije uši	Čađava pegavost, krastavost plodova, kruškina buva	Prevent 80 WP Corelle D + Cyrasil	2,5 kg/ha 0,15 % 0,025 - 0,05 %
Beli baloni	Čađava pegavost i krastavost plodova, kruškina buva, vaši, smotavci, voćne ose, grinje	Kanton 700 WG Calcio 75 WG Fossal 80 WP Futocid EC Monofos 20 SP	0,07 % 200 g/ha 1 kg/ha 0,05 % 0,05 %
Cvetanje	Čađava krastavost, monilija, bakteriozna plamenjača	Prevent 80 WP Botus SC 400 Fossal 80 WP	2,5 kg/ha 0,1 % 0,1 %
Precvetavanje	Čađava krastavost, rđa kruške, bakteriozna plamenjača, kruškina buva, eriofidne grinje	Primus 80 WG Vegas 250 EC ili Score 250 EC Fossal 80 WP Futocid EC	0,2 % 0,025 % 1 kg/ha 0,05 %
Oformljeni plodovi	Čađava krastavost, siva pegavost, rđa kruške, kruškina buva, vaši, grinje	Vegas 250 EC ili Score 250 EC Kanton 700 WG Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC + Nexiram 10 EC + Cyrasil	0,025 % 0,07 % 1 l/ha +1 l/ha + 0,025 - 0,05 %
Porast plodova	Čađava pegavost, krastavost plodova, jabukin smotavac, kruškina buva	Prevent 80 WP Affirm 095 SG Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC + Nexiram 10 EC + Cyrasil	2,5 kg/ha 3 kg/ha 1 l/ha + 1 l/ha + 0,025 - 0,05 %
Porast plodova (prva polovina juna)	Čađava krastavost, jabukin smotavac, kruškina buva, vaši	Kanton 700 WG Milbeknock + Nexiram 10 EC	0,05 % 0,15 % + 0,1 %
Porast plodova (kraj juna)	Čađava krastavost, jabukin smotavac, kruškina buva	Primus 80 WG Avatar EC 15 Monofos 20 SP	0,2 % 0,035 % 0,05 %
Porast plodova (tokom jula)	Čađava pegavost, krastavost plodova, skladišne bolesti, kruškina buva	Prevent 80 WP Prunus 450 SC Widya 240 SC	0,25 % 0,1 % 0,06 %



PLAN ZAŠTITE KRUŠKE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Koncentracija primene
15 dana pred berbu	Skladišne štetočine, jabukin smotavac, kruškina buva	Markiz WG Affirm 095 SG	0,2 % 2,5 kg/ha
Jesenji plavi tretman	Bakterioze Čađava pegavost i krastavost plodova	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,4% 0,5%

NOVO!

OviteX

ИНСЕКТИЦИД

Kontaktni insekticid i akaricid na bazi parafinskog ulja, za suzbijanje širokog spektra štetočina u voćarstvu.

Insekticid i akaricid na bazi parafinskog ulja za suzbijanje širokog spektra štetočina.

OPASNOST!

SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU!

Suzbijanje korova:

Dessicash SL 3-4l/ha kada su korovi 15-20cm visine (uskolisi i širokolisi) – Zasadi mlađi od 4 godine.

Rugby 15-SL 5l/ha – Zasadi stariji od 1 godine.

Quick EC ili Lector Super 2l/ha (uskolisi korovi).

SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU!

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!