

**PLANovi  
ZAŠTITE**

**Agroarm®**

**VOĆARSTVO**



## SADRŽAJ

1 Jabuka

5 Kruška

7 Šljiva

8 Višnja

10 Breskva

12 Malina

14 Kupina

15 Jagoda

17 Borovnica

18 Vinova loza

**ZA POUZDANU  
ZAŠTITU JABUKE!**

**Kanton® 700 WG**

**PRUNUS® 450 SC**

**Primus® 80 WG**

**VEGAS® 250 EC**

**ATLETIC® 095 SG**

**WIDYA® 240-SC**

**NEXIRAM® 10 EC**

**AVATAR® EC-15**

## PLAN ZAŠTITE JABUKE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
FAZA (B) Bubrenje i pucanje pupoljaka	Čađava krastavost, bakteriozna plamenjača, prezimljujuće forme štetočina	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG  Ovitex	3 kg/ha 4 kg/ha  20 - 30 l/ha
FAZA (C) Pred mišje uši	Čađava krastavost, jabukin cvetojed	Prevent 80 WP <b>Cyren 480 EC</b>	2,5 - 3 kg/ha 1,5 l/ha
FAZA (C2)-(D) Mišje uši	Čađava krastavost, pepelnica, jabukin cvetojed	Prevent 80 WP Botus SC 400 preparat na bazi sumpora <b>Futocid EC</b>	2,5 - 3 kg/ha 1 l/ha 3 kg/ha 0,5 l/ha
FAZA (D3) Zeleni buketići	Čađava krastavost, pepelnica, lisne vaši, cvetojed	Botus SC 400 Prevent 80 WP preparat na bazi sumpora <b>Notikor 200 EC</b>	1 l/ha 2,5 - 3 kg/ha 3 kg/ha 0,2 l/ha
FAZA (E) Roze pupoljak	Čađava krastavost  Pepelnica, lisna galica, cvetojed	Prevent 80 WP Calcio 75 WG  Tebusha 25% EW ili Oligosan 25-EC <b>Corelle D</b>	2,5 - 3 kg/ha 200 g/ha  0,3 l/ha 1,5 l/ha
FAZA (E2) Pred otvaranje cvetova	Čađava krastavost  Bakteriozna plamenjača, pepelnica	Kanton 700 WG Calcio 75 WG  Fossal 80 WP ili Fortuna 80-WG Token 100 EC ili Topas 10 EC	0,7 kg/ha 200 g/ha  1 kg/ha 0,5 l/ha
FAZA (F) Početak cvetanja (od 1-5 % otvorenih cvetova)	Čađava krastavost, pepelnica  Bakteriozna plamenjača	Kanton 700 WG Botus SC 400  Fossal 80 WP ili Fortuna 80-WG	0,7 kg/ha 1 l/ha  1 kg/ha
FAZA (F2 – G) Puno cvetanje	Čađava krastavost, bakteriozna plamenjača, lisna pegavost ( <i>Alternaria sp.</i> ), pepelnica	Kanton 700 WG Fossal 80 WP ili Fortuna 80-WG Vegas 250 EC ili Score 250 EC	0,7 kg/ha 1 kg/ha 0,25 - 0,35 l/ha
FAZA (H) Precvetavanje	Čađava krastavost, pepelnica  Lisne vaši, lisni mineri	Kanton 700 WG Vegas 250 EC ili Score 250 EC Fossal 80 WP ili Fortuna 80-WG <b>Corelle D</b>	0,7 kg/ha 0,25 - 0,35 l/ha 1 kg/ha 1,5 l/ha
FAZA (I) Formirani plodovi	Čađava krastavost Pepelnica Lisna pegavost ( <i>Alternaria sp.</i> ) Jabukin smotavac, lisne vaši, lisni mineri	Vegas 250 EC ili Score 250 EC Zignal 500 SC  <b>Nexiram 10 EC</b> + <b>Monofos 20 SP ili Epik 20-SG</b>	0,25 - 0,35 l/ha 1 l/ha  1 l/ha  0,5 kg/ha



## PLAN ZAŠTITE JABUKE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
FAZA (J) Porast plodova	Čađava krastavost, pepelnica Lisna pegavost ( <i>Alternaria sp.</i> ) Jabukin smotavac, lisne vaši	Zignal 500 SC Vegas 250 EC ili Score 250 EC  Affirm 095 SG ili Affirm Opti + Warrant 70 WG ili Mido 20% SL	1 l/ha 0,25 - 0,35 l/ha  3 kg/ha ili 2 kg/ha  0,2 kg/ha ili 0,25 l/ha
FAZA (J2 - K) Porast plodova	Čađava krastavost Pepełnica Jabukin smotavac, lisne vaši, lisni mineri	Zignal 500 SC Tebusha 25 EW ili Oligosan 25-EC  Cortez 480 SC	1 l/ha 0,3 l/ha  0,35 l/ha
Nakon 7-15 dana	Čađava krastavost Pepełnica Jabukin smotavac Lisne vaši	Primus 80 WG Topas 100 EC ili Token 100 EC  Cortez 480 SC	2 - 3 kg/ha 0,5 l/ha  0,35 l/ha
Nakon 7-15 dana	Čađava krastavost Skladišne bolesti Jabukin smotavac Lisne vaši, lisni mineri, jabukina voćna osa	Primus 80 WG Tebusha 25 EW ili Oligosan 25-EC  Futocid EC	2 - 3 kg/ha 0,3 l/ha  0,5 l/ha
Nakon 7-15 dana	Čađava krastavost, skladišne bolesti Lisne vaši, mineri, jabukin smotavac, jabukina voćna osa	Primus 80 WG Feribot 225 SC Nexiram 10 EC + Monofos 20 SP ili Epik 20-SG	2 - 3 kg/ha 1 l/ha 1 l/ha 0,5 kg/ha
Nakon 7-15 dana	Skladišne bolesti Jabukin smotavac Mineri	Primus 80 WG Prunus 450 SC Avatar EC 15 Futocis 2.5 EC	2 - 3 kg/ha 1 l/ha 0,35 l/ha 0,3 l/ha
7 dana pred berbu	Skladišne bolesti, jabukin smotavac, lisni mineri	Feribot 225-SC Affirm Opti	1 l/ha 2 kg/ha
Suzbijanje grinja posle cvetanja, tokom vegetacije	Grinje	Widya 240 SC	0,4 - 0,6 l/ha
Sredina maja		Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	1,5 l/ha
U toku vegetacije po potrebi		Milbeknock EC + Ovitex	1,25 l/ha  2 - 3 l/ha

**Suzbijanje korova:**

Sirkasan SL 2 - 8 l/ha, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (za zasade starije od 4 godine)

Dessicash SL 3 - 4 l/ha kada su korovi 15-20cm visine (uskolisni i širokolisni)

Rugby 15-SL 5l/ha – Zasadi stariji od 1 godine.

Quick EC ili Lector Super 2l/ha (uskolisni korovi)

U primeni Dessicasha dodati okvašivač Cyrasil 0,1%

**SPREĆITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU!**


**Svaki put kad kiša traje duže od 24 sata tokom maja i početkom juna dodati u tretmane:**

Vegas 250 EC ili Score 250 EC 0,25 - 0,35 l/ha

**PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!**




# FAZE RAZVOJA JABUKE



- A Pupoljci zatvoreni
- B Pucanje pupoljaka
- C Zelena tačka
- C<sub>3</sub> Mišje uši
- D Prvi listovi se otvaraju
- D<sub>3</sub> Prvi listovi se otvaraju
- E Roze pupoljak
- E<sub>2</sub> Roze pupoljak

- F Centralni cvet otvoren
- F<sub>2</sub> Puno cvetanje
- G Početno opadanje latica
- H Sve laticice opale
- I Plodovi formirani
- J Plodovi uvećani
- K Plodovi razvijeni
- L Plodovi zreli

**Kontaktni, preventivni fungicid dugog rezidualnog delovanja za zaštitu plodova jabuke od skladišnih bolesti.**



**Sistemični fungicid sa protективnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje pruјrokovala bakteriozne plamenjače jabučastog voća (*Erwinia amylovora*).**

## PLAN ZAŠTITE KRUŠKE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Kretanje vegetacije	Kruškina buva	Ovitex + Notikor 200 EC	30 l/ha 0,5l/ha
Bubrenje pupoljaka	Čađava pegavost i krastavost plodova, bakteriozna plamenjača	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	3 kg/ha 4 kg /ha
Mišije uši	Čađava pegavost i krastavost plodova, kruškina buva	Prevent 80 WP Nexiram 10 EC + Corelle D + Cyrasil	2,5 kg/ha 1 l/ha 1,5 l/ha + 0,25 - 0,5 l/ha
Beli baloni	Čađava pegavost i krastavost plodova, kruškina buva, vaši, smotavci, voćne ose, grinje	Kanton 700 WG Calcio 75 WG Fossal 80 WP ili Fortuna 80-WG Futocid EC Monofos 20 SP ili Epik 20-SG	0,7 kg/ha 200 g/ha 1 kg/ha 0,5 l/ha 0,5 kg/ha
Cvetanje	Čađava pegavost i krastavost plodova, monilija, bakteriozna plamenjača	Prevent 80 WP Botus SC 400 Fossal 80 WP ili Fortuna 80-WG	2,5 kg/ha 1 l/ha 1 kg/ha
Precvetavanje	Čađava pegavost i krastavost plodova, rđa kruške, bakteriozna plamenjača, kruškina buva, eriofidne grinje	Prevent 80 WP Vegas 250 EC ili Score 250 EC Fossal 80 WP ili Fortuna 80-WG Futocid EC	2,5 kg/ha 0,25 l/ha 1 kg/ha 0,5 l/ha
Oformljeni plodovi	Čađava pegavost i krastavost plodova, siva pegavost, rđa kruške, kruškina buva, vaši, grinje	Vegas 250 EC ili Score 250 EC Kanton 700 WG Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC + Nexiram 10 EC + Cyrasil	0,25 l/ha 0,7 kg/ha 1 l/ha +1 l/ha + 0,25-0,5 l/ha
Porast plodova	Čađava pegavost i krastavost plodova, jabukin smotavac, kruškina buva	Prevent 80 WP Vegas 250 EC ili Score 250 EC Affirm 095 SG Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC + Nexiram 10 EC + Cyrasil	2,5 kg/ha 0,25 l/ha 3 kg/ha 1 l/ha + 1 l/ha + 0,25 - 0,5 l/ha
Porast plodova (prva polovina juna)	Čađava pegavost i krastavost plodova, jabukin smotavac, kruškina buva, vaši	Kanton 700 WG Milbeknock + Nexiram 10 EC	0,5 kg/ha 1,5 l/ha 1 l/ha
Porast plodova (kraj juna)	Čađava pegavost i krastavost plodova, jabukin smotavac, kruškina buva	Primus 80 WG Avatar EC 15 Monofos 20 SP ili Epik 20-SG	2 kg/ha 0,35 l/ha 0,5 kg/ha
Porast plodova (tokom jula)	Čađava pegavost i krastavost plodova, skladišne bolesti, kruškina buva	Prevent 80 WP Feribot 225-SC Widya 240-SC	2,5 kg/ha 1 l/ha 0,6 l/ha



## PLAN ZAŠTITE KRUŠKE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
15 dana pred berbu	Skladišne bolesti, jabukin smotavac, kruškina buva	Prunus 450 SC Affirm 095 SG	1 l/ha 2,5 kg/ha
Jesenji plavi tretman	Bakterioze Čađava pegavost i krastavost plodova	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	4 kg/ha 5 kg/ha

NOVO!



# Ovitek

И Н С Е К Т И Ц И Д



**Kontaktni insekticid i akaricid na bazi parafinskog ulja, za suzbijanje širokog spektra štetočina u voćarstvu.**

**Suzbijanje korova:**

Sirkosan SL 2 - 8 l/ha, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (za zasade starije od 4 godine)

Dessicash SL 3 - 4 l/ha kada su korovi 15-20cm visine (uskolisni i širokolisni)

Rugby 15-SL 5l/ha – Zasadi stariji od 1 godine.

Quick EC ili Lector Super 2l/ha (uskolisni korovi)

U primeni Dessicasha dodati okvašivač Cyrasil 0,1%

**SPREĆITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU!**

**PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!**



## PLAN ZAŠTITE ŠLJIVE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Prvo prolećno tretiranje, bubrenje cvetnih pupoljaka	Monilija, šupljikavost lišća	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG + Ovitex	0,3 % 0,35 % 2 %
Beli baloni	Monilija	Calcio 75 WG	200 g/ha
Cvetanje	Monilija	Markiz WG	0,75 kg/ha
Precvetavanje	Monilija, šupljikavost lišća, plamenjača, osa šljive, biljne vaši	Calcio 75 WG Prevent 80 WP Ditox 40 EC	200 g/ha 2,5 kg/ha 0,15 %
Plod oformljen	Šupljikavost lišća, monilija, šljivin smotavac, biljne vaši	Primus 80 WP Tebusha 25 EW ili Oligosan 25-EC Corelle D	2,5 kg/ha 0,075 % 1 l/ha
Dve nedelje kasnije (promena boje ploda)	Trulež plodova, šljivin smotavac	Prunus 450 SC Futocid EC	1 l/ha 0,05 %
2 nedelje pred berbu	Trulež plodova, šljivin smotavac	Markiz WG Futocis 2,5 EC	0,75 kg/ha 0,05 %
Jesenje tretiranje (nakon opadanja lišća)	Monilija, šupljikavost lišća, plamenjača šljive	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,3 % 0,35 %

**Suzbijanje korova:**

Sirkosan SL 2 - 8 l/ha, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (za zasade starije od 4 godine)

Dessicash SL 3 - 4 l/ha kada su korovi 15-20cm visine (uskolisni i širokolistni)

Rugby 15-SL 5l/ha – Zasadi stariji od 1 godine.

Quick EC ili Lector Super 2l/ha (uskolisni korovi)

U primeni Dessicasha dodati okvašivač Cyrasil 0,1%

**SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU!**

**PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!**



## PLAN ZAŠTITE VIŠNJE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Prvo prolećno tretiranje (bubrenje cvetnih pupoljaka)	Monilija, šupljikavost lišća  Biljne vaši, grinje	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG + Ovitex	0,3 %  0,35 %  2 %
Beli baloni	Monilija	Calcio 75 WG	200 g/ha
Cvetanje	Monilija	Markiz WG	0,75 kg/ha
Precvetavanje	Monilija, šupljikavost lišća surlaš višnje, biljne vaši	Calcio 75 WG  Prevent 80 WP  Corelle D	200 g/ha  2,5 kg/ha  0,1 %
Plodovi veličine zrna graška	Monilija, šupljikavost i pegavost lista trešnjina muva, biljne vaši	Tebusha 25% EW ili Oligosan 25-EC  Kanton 700 WG  Ditox 40 EC	0,075 %  0,075 %  0,1 %
Promena boje ploda	Trulež ploda, pegavost lista  Biljne vaši, trešnjina muva	Primus 80 WP  Prunus 450 SC  Monofos 20 SP ili Epik 20-SG  Futocis 2,5 EC	2,5 kg/ha  1 l/ha  0,025 %  0,05 %
Dve nedelje pre berbe	Trulež ploda, trešnjina muva	Markiz WG  Futocis 2,5 EC	0,75 kg/ha  0,03 %
Posle berbe	Lisna pegavost  Grinje	Kanton 700 WG  Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,075 %  0,1 %
	Žilogriz	Rovex Super	2 l/ha (inkorporacija u zoni reda)
Jesenje tretiranje (nakon opadanja lišća)	Monilija, šupljikavost lišća	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,3 %  0,35 %

Suzbijanje korova:

Sirkasan SL 2 - 8 l/ha, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (za zasade starije od 4 godine)

Dessicash SL 3 - 4 l/ha kada su korovi 15-20cm visine (uskolisni i širokolisni)

Rugby 15-SL 5l/ha – Zasadi stariji od 1 godine.

Quick EC ili Lector Super 2l/ha (uskolisni korovi)

U primeni Dessicasha dodati okvašivač Cyrasil 0,1%

SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU!

**PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!**

# PRUNUS<sup>®</sup>

## 450 SC

ФУНГИЦИД



Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovaca sušenja cvetova i rodnih grančica i mrke truleži plodova.

## PLAN ZAŠTITE BRESKVE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Mirovanje vegetacije	Kovrdžavost lista, šupljikavost lista, prezimljujuće forme, štetnih insekata	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG + Ovitex	0,3 % 0,4 %  2 %
Na početku bubrenja pupoljaka	Kovrdžavost lista	Fitociram 75 S	0,3%
Zelena tačka	Kovrdžavost lista	Fitociram 75 S	0,3 %
Roze pupoljak	Kovrdžavost lista, pepelnica, tripsi	Kanton 700 WG Token 100 EC ili Topas 100 EC Futocid EC	0,1 % 0,05 % 0,05 %
Cvetanje	Monilija	Calcio 75 WG	200 g/ha
Precvetavanje	Monilija, pepelnica šupljikavost lista tripsi, biljne vaši	Prunus 450 SC Prevent 80 WP Monofos 20 SP ili Epik 20-SG Futocis	0,05 - 0,1 % 0,25 % 0,04 % 0,05 %
Formirani plodovi	Monilija, pepelnica šupljikavost lista breskvin smotavac, biljne vaši	Tebusha 25 EW ili Oligosan 25-EC  Primus 80 WG  Skener 25 WG + Nexiram 10 EC	0,075 %  2,5 kg/ha  0,02 % + 0,1 %
Nakon proređivanja	Monilija, pepelnica, šupljikavost lista breskvin smotavac	Tebusha 25 EW ili Oligosan 25-EC Kanton 700 WG Ditox 40 EC	0,075 % 0,075 % 0,1 %
15 dana pred berbu	Bolesti ploda Štetni insekti	Markiz WG Futocid EC	0,75 kg/ha + 0,03%
Poslednji tretman pred berbu	Trulež ploda, breskvin smotavac, biljne vaši	Enigma 62,5 WG Futocis 2.5 EC	0,08% 0,03%
Posle berbe	Grinje	Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,1%
	Žilogriz	Rovex Super	2 l/ha (inkorporacija u zoni reda)
Jesenji plavi tretman	Kovrdžavost lista, šupljikavost lista	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,3%  0,4%

Suzbijanje korova:

Sirkosan SL 2 - 8 l/ha, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (za zasade starije od 4 godine)

Dessicash SL 3 - 4 l/ha kada su korovi 15-20cm visine (uskolisni i širokolisni)

Rugby 15-SL 5l/ha – Zasadi stariji od 1 godine.

Quick EC ili Lector Super 2l/ha (uskolisni korovi)

U primeni Dessicasha dodati okvašivač Cyrasil 0,1%

SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU!

**PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!**

# Bektin® 18 EC

INSEKTICID



Insekticid i akaricid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu.

## PLAN ZAŠTITE MALINE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Prvo prolećno tretiranje, bubrenje pupoljaka - pučanje pupoljaka (nakon vezivanja)	Didimela, sušenje lastara, antraknoza	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG + Ovitex + Futocid EC	0,3 % 0,35 %
	Prezimljujuće forme štetočina (biljne vaši, erofidne grinje)		2 % 0,03 - 0,05 %
Drugo prolećno tretiranje, tokom početka listanja	Didimela, antraknoza	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,3 % 0,35 %
Treće prolećno tretiranje, pred jasno izdvajanje cvetnih pupoljaka (bočni lastari dužine 10-15 cm)	Didimela, siva trulež, rđa maline	Kanton 700 WG + Monofos 20 SP ili Epik 20-SG + Bektin 18 EC ili Romectin	0,07 %
	Biljne vaši, cvetojed maline, mušica maline		0,025 %
	Erofidna grinja lista		0,1 %
Četvrto prolećno tretiranje, neposredno pre cvetanja	Plamenjača maline	Supernova 72 WP	65 g na 10 l vode na 10 m dužnih (zalivanjem zemljišta u brazde po 30 cm s obe strane reda)
	Siva trulež	Botus SC + Exacta 250 SC ili Azaka 250 SC + Futocid EC	0,2 %
	Didimela, rđa		0,075 %
	Malinina buba, cvetojed maline, mušica maline		0,03 %
14 dana pred berbu	Siva trulež plodova, didimela	Markiz WG ili Polyversum + Exacta 250 SC ili Azaka 250 SC	1,5 - 1,8 kg/ha 0,1 kg/ha 0,075 %
7 dana pre berbe	Siva trulež plodova	Enygma 62,5 WG	0,08%
3 dana pre berbe	Siva trulež plodova	Timorex Gold	2 l/ha

## PLAN ZAŠTITE MALINE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Nakon berbe	Didimela, rđa, sušenje lastara	Exacta 250 SC ili Azaka 250 SC + Prevent 80 WG  +	0,075 % 0,25 %
	Muva galica	Skener 250 WG + Ortus 5 SC	0,02 %  0,1 %
	Eriofidna grinja lista		
Tretiranje pre opadanja lišća	Didimela, sušenje lastara	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,3 %  0,35 %



**TIMOREX GOLD** STK  
The smart way to grow.

**Биофунгицид**  
**TIMOREX GOLD**

за примену у  
малини, виновој лози,  
паприци и краставцу

1 литар

www.stockton-sg.com

STK Stockton Group



**Biofungicid za primenu u malini, vinovoj lozi, paprici i krastavcu. Preparat je registrovan za organsku proizvodnju.**

*Suzbijanje korova:*

Dessicash SL 3-4l/ha kada su korovi 15-20cm visine (uskolisni i širokolisni)

Rugby 15-SL 5l/ha – Zasadi stariji od 1 godine.

Quick EC ili Lector Super 2l/ha (uskolisni korovi).

**SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU!**

**PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!**

## PLAN ZAŠTITE KUPINE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Bubrenje - pucanje pupoljaka	Bolesti izdanaka, prezimljavajuće forme insekata	Kocide 2000 ili Neoram 37.5WG + Ovitex + Futocid EC	0,35 % 2 % 0,03 - 0,05 %
Početak listanja	Bolesti izdanaka, eriofidne grinje	Kanton 700 WG + Bektin 180 EC ili Romectin	0,07% 0,1%
Pred jasno izdvajanje zatvorenih cvetova	Rđa kupine, ljubičasta pegavost, štetni insekti	Vegas 250 EC + Primus 80 WP + Monofos 20 SP ili Epic 20-SG	0,025% 0,2% 0,025%
Neposredno pred cvetanje	Rđa kupine, ljubičasta pegavost, siva trulež, štetni insekti	Vegas 250 EC + Botus SC 400 + Futocid EC	0,025% 0,2% 0,03%
Cvetanje (14 dana pred berbu)	Siva trulež plodova, ljubičasta pegavost	Enygma 62.5 WG + Exacta 250 SC ili Azaka 250 SC	0,08% 0,075%
7 dana pred berbu	Siva trulež plodova	Enygma 62.5 WG	0,08%
3 dana pred berbu	Siva trulež plodova	Timorex Gold	2l/ha
Posle berbe	Bolesti izdanka  Štetni insekti  Grinje	Exacta 250 SC ili Azaka 250 SC + Prevent 80 WG + Skener 250WG + Ortus 5 SC	0,075% 0,25% 0,02% 0,15%
Jesenje tretiranje	Bolesti izdanka	Kocide 2000 ili Neoram 37.5 WG	0.3% ili 0.35%

**Suzbijanje korova:**

*Desicash SL , 3-4 l/ha, kada su korovi 15-20 cm visine (uskolisni i širokolisni)*

*Rugby 15-SL , 5l/ha - Zasadili stariji od 1 godine*

*Quick EC ili Lector super, 2 l/ha (uskolisni korovi)*

**SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU!**

**PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!**



## PLAN ZAŠTITE JAGODE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Prvo prolećno tretiranje, kretanje vegetacije	Pegavost lista	Prevent 80 WP	2 kg/ha
	Vlažna trulež korenovog vrata	Supernova 72 WP	65 g na 10 l vode na 10 m dužnih (zalivanjem zemljišta u brazde po 30 cm s obe strane reda)
Drugo prolećno tretiranje, formiranje cvetnih pupoljaka	Pegavost lista	Tebusha 25 EW ili Oligosan 25-EC + Ditox 40 EC	0,5 l/ha
	Cvetojed jagode, biljne vaši, grinje		1 l/ha
	Zemljišne štetočine	Zemljišni insekticid	
Treće prolećno tretiranje, neposredno pre cvetanja	Antraknoza, pegavost lista, pepelnica, siva trulež	Prevent 80 WP + Vegas 250 EC + Botus SC-400 + Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	2 kg/ha 0,03 % 2 l/ha 1 l/ha
	Grinje		
	Vaši	Skener 25 WG	0,2 kg/ha
Početak cvetanja	Siva trulež	Markiz WG +	1,5 - 1,8 kg/ha
	Antraknoza, pegavost lista, pepelnica	Exacta 250 SC ili Azaka 250 SC	0,75 - 1 l/ha
Puno cvetanje	Siva trulež plodova	Enygma 62,5 WG	0,8 kg/ha
Početak sazrevanja plodova, do 7 dana pre berbe	Siva trulež plodova	Enygma 62,5 WG	0,8 kg/ha
3 dana pred berbu	Siva trulež plodova	Timorex Gold	2 l/ha
U toku berbe	Siva trulež plodova	Polyversum	0,15 kg/ha



## PLAN ZAŠTITE JAGODE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Posle berbe	Pegavost lista, antraknoza, pepelnica	Primus 80 WG + Tebusha 25 EW ili Oligosan 25-EC	2 kg/ha 0,75 l/ha
	Štetni insekti	Corelle D	0,1 %
	Zemljišne štetočine	Rovex Super	2 l/ha (zalivanje)
	Grinje	Ortus 5 SC	0,1%

ENYGMA® 62,5 WG

FUNGICID

Novo!

**ENYGMA® 62,5 WG**  
ФУНГИЦИД

ENYGMA® 62,5 WG је системични фолијарни фунгицид, са протективним и куративним деловањем, у облику вододисперзибилних гранула (WG), за сузбијање проузроковача сиве трулежи винове лозе.

САДРЖИ: CIPRODINIL 375 g/kg  
FLUDIOKSONIL 250 g/kg

ПРЕ УПОТРЕБЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ЕТИКЕТУ И ПРИДЕЋЕ ИДОЛСТВО  
Придевајати се упутство за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.

Agroarm

**100 g**

**Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje sive truleži u zasadu maline i jagode.**

*Suzbijanje korova:*

*Dessicash 20 SL: 3-4 l/ha + Cyrasil 0,1% (obavezno spreciti zanošenje preparata na gajenu biljku)*

**PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!**



## PLAN ZAŠTITE BOROVNICE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Završetak mirovanja vegetacije	Bolesti izdanaka, rak stabla, antraknoza, prezimljujuće forme insekata i grinja	Kocide 2000 ili Neoram 37.5WG + Ovitex + Futocid EC	0,3% ili 0,35%  2%  0,03%
Pucanje pupoljaka	Bolesti lertorasta, antraknoza, rak stabla, grinje	Primus 80 WP + Ortus 5 SC	0,2%  0,1%
Pred cvetanje	Monilija cveta, siva trulež, pepelnica, lisne vaši, cvetojed	Botus SC 400 + Exacta 250 SC ili Azaka 250 SC + Futocid EC	0,2%  0,075%  0,03%
Precvetavanje (pred početak zrenja)	Monilija ploda, siva trulež plodova, antraknoza ploda, štetni insekti	Exacta 250 SC ili Azaka 250 SC + Enygma 62,5 WG + Polyversum + Futocid EC	0,075%  0,08%  0,15 kg/ha  0,03%
7 dana pred berbu	Siva trulež plodova	Enygma 62,5 WG	0,08%
3 dana pred berbu	Siva trulež plodova	Timorex Gold	2l/ha
1 dan pred berbu	Antraknoza plodova, siva trulež plodova	Polyversum	0,15 kg/ha
Posle berbe	Bolesti izdanaka, štetni insekti	Primus 80 WP + Corelle D	0,2%  0,15%

**Suzbijanje korova:**

Dessicash SL , 3-4 l/ha, kada su korovi 15-20 cm visine (uskolisni i širokolisni)

Rugby 15-SL , 5l/ha - Zasadi stariji od 1 godine

Quick EC ili Lector super, 2 l/ha (uskolisni korovi)

**SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU!**



## PLAN ZAŠTITE VINOVE LOZE

Vreme primene/ razvojni stadijum	Naziv patogena/ štetočine	Naziv preparata	Doza/ koncentracija
Lastari dužina 5-10 cm	Crna pegavost, pepelnica Eriofidne grinje	Prevent 80 WP Azaka 250 SC Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,25 % 0,075 % 0,1 %
Lastari dužine 20 – 30 cm	Plamenjača, crna pegavost, pepelnica, eriofidne grinje	Fossal 80 WP ili Fortuna 80-WG Tebusha 25 EW ili Oligosan 25-EC Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC	0,25 % 0,4 l/ha 0,1 %
Pred cvetavanje	Plamenjača, crna pegavost, pepelnica Grinje, grožđani moljaci	Cymbol Tebusha 25 EW ili Oligosan 25-EC Bektin 18 EC ili Romectin 18 EC Futocid EC	250 g/ha 0,4 l/ha 0,1 % 0,05 %
Precvetavanje	Plamenjača, crna pegavost, pepelnica siva trulež, cikade	Fossal 80 WP ili Fortuna-80 WG Topas 100 EC Botus SC 400 Notikor 200 EC	2 kg/ha 0,025 % 2 l/ha 0,03 %
Formiranje bobica	Plamenjača, pepelnica, siva trulež grožđani moljaci	Fossal 80 WP ili Fortuna 80-WG Tenor 250 EC Enygma 62,5 WG Futocid EC + Nexiram 10 EC	2 kg/ha 0,15 l/ha 0,08 % 0,05 % 0,1 %
Zatvaranje grozda	Plamenjača, pepelnica, siva trulež, grožđani moljaci	Valis M Token 100 EC Botus SC 400 Futocis 2.5 EC	2,5 l/ha 0,025 % 2 l/ha 0,05 %
Formiran grozd	Plamenjača, pepelnica, siva trulež, grožđani moljaci	Curzate C Extra Vegas 250 EC ili Score 250 EC Enygma 62,5 WG Futocis 2.5 EC	2 kg/ha 0,02 % 0,08 % 0,05 %
Početak šarka	Plamenjača	Kocide 2000 ili Neoram 37,5 WG	0,2 % 0,4 %
	Pepelnica, siva trulež	Preparat na bazi a.m. sumpor  Enygma 62,5 WG	0,08 %

Suzbijanje korova:

Sirkosan SL 2 - 8 l/ha, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta (za zasade starije od 4 godine)

Dessicash SL 3 - 4 l/ha kada su korovi 15-20cm visine (uskolisni i širokolisni)

Rugby 15-SL 5l/ha – Zasadi stariji od 1 godine.

Quick EC ili Lector Super 2l/ha (uskolisni korovi)

U primeni Dessicasha dodati okvašivač Cyrasil 0,1%

SPREČITI ZANOŠENJE HERBICIDA NA GAJENU BILJKU!

**PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI UPUTSTVO ZA UPOTREBU!**

# AVATAR<sup>®</sup> EC-15

И Н С Е К Т И Ц И Д



Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, koji se koristi za suzbijanje sivog grozdovog smotavca.



**Cyrasil je organsko-silikonski okvašivač koji smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine i distribuciju preparata po tretiranoj površini.**

**Naša Јабука**

**Права српска јабука**

**[www.nasajabuka.rs](http://www.nasajabuka.rs)**

**NAŠA JABUKA d.o.o.**

**Adresa plantaže: Vodanj bb, 11328 Vodanj, Smederevo**

**E-mail: [info@nasajabuka.rs](mailto:info@nasajabuka.rs)**



## SLUŽBA PRODAJE



<b>DC Beograd</b>  Sreten Radosavljević 062 370 813 sreten.agroarm@gmail.com	<b>DC Beograd</b>  Slavica Beljinac 062 380 096 slavica.agroarm@gmail.com	<b>DC Beograd</b>  Saša Životić 062 438 034 sasa.agroarm@gmail.com
<b>DC Niš</b>  Predrag Petrović 062 380 841 predrag.agroarm@gmail.com	<b>DC Niš i DC Čačak</b>  Dragan Đaković 064 821 95 97 dragan.agroarm@gmail.com	<b>DC Čačak</b>  Dušan Knežević 065 600 55 11 knezevic.agroarm@gmail.com
<b>DC Beograd i DC Futog</b>  Marko Jović 062 380 747 jojicmarko@gmail.com	<b>DC Futog</b>  Lazar Nenadov 062 438 066 lazar.agroarm@gmail.com	<b>DC Futog</b>  Miloš Nikšić 062 380 834 niksic.agroarm@gmail.com

	<b>TEHNIČKA SLUŽBA</b>	
<b>Beograd, Ub, Srem i Mačva</b>  Dušan Marinković 065 354 634 dusan.agroarm@gmail.com	<b>Vojvodina</b>  Ranko Njegovan 064 821 45 32 ranko.agroarm@gmail.com	<b>Centralna Srbija</b>  Miloš Čeković 064 821 95 81 milos.agroarm@gmail.com
<b>Južna Srbija</b>  Marko Mladenović 064 821 95 84 maarko78@gmail.com	<b>Zapadna Srbija</b>  Milojica Pešić 062 380 535 milojica.agroarm@gmail.com	

**Beograd-Vrčin / Moše Pijade 19 b**  
Tel: 011 373 90 20 / Tel: 011 373 90 14 / Fax: 011 373 90 13

**Čačak / Preljina bb**  
Tel: 032 380 132 / Fax: 032 381 132

**Niš / Ivana Milutinovića 30**  
Tel: 018 428 51 62 / Fax: 018 428 50 10

**Futog / Železnička bb**  
Tel: 021 897 393 / Fax: 021 897 466

**Zrenjanin / Mihajlovački drum bb**  
Tel: 062 380 569

[office@agroarm.rs](mailto:office@agroarm.rs)

[www.agroarm.rs](http://www.agroarm.rs)